First Hit

Previous Doc

**Next Doc** 

Go to Doc#

Generate Collection Print

L2: Entry 25 of 29

File: DWPI

Mar 23, 1990

DERWENT-ACC-NO: 1990-135656

DERWENT-WEEK: 199843

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Hair tonic compsn. - contg. extract(s) of Cedrela sinensis Jussied, Melia

Azedarach Linne, etc. plants

PATENT-ASSIGNEE: SHISEIDO CO LTD (SHIS)

PRIORITY-DATA: 1988JP-0236078 (September 20, 1988)

Search Selected Search ALL Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

☐ JP 02083310 A

JP 2787450 B2

March 23, 1990
August 20, 1998

005

Go to Doc#

A61K007/06

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 02083310A

September 20, 1988

1988JP-0236078

JP 2787450B2

September 20, 1988

1988JP-0236078

JP 2787450B2

JP 2083310

Previous Publ.

INT-CL (IPC): A61K 7/06

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02083310A

BASIC-ABSTRACT:

Hair tonic material contains one or more <u>extracts of Cedrela sinensis</u> JUSSIED, Melia Azedarach LINNE, Melia elia azedarach LINNE, and Pilocarpus plants.

ADVANTAGE - Prevents dandruff and loss of hair.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02083310A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

DERWENT-CLASS: D21 CPI-CODES: D08-B03;

Previous Doc Next Doc

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−83310

Solnt, Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)3月23日

A 61 K 7/06

8314-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 養毛料

②特 願 昭63-236078

**20出 顧 昭63(1988)9月20日** 

**@発明者宮原 令二神奈川県** 

神奈川県横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研

究所内

@発 明 者 石 野 章 博 神奈川県横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研

究所内

⑫発 明 者 髙 橋 祥 二 東京都中央区銀座7丁目5番5号

⑪出 願 人 株式会社資生堂 東京都中央区銀座7丁目5番5号

明 細 曹

1. 発明の名称

菱毛科

2. 特許請求の範囲

(1)センダン科のチャンチン抽出物、タイワンセンダン抽出物、センダン抽出物、プラジルのアンジュローバ抽出物及びミカン科のジャボランジ抽出物の一種または二種以上を含有することを特徴とする獲毛料。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、センダン科のチャンチン抽出物、タイワンセンダン抽出物、センダン抽出物、プラジルのアンジュローバ抽出物及びミカン科のジャボランジ抽出物の一種または二種以上を含有することにより、脱毛防止、発毛、育毛等を促進する効果に優れた養毛科に関するものである。

[ 従来の技術]

従来より、各種薬剤を配合した養毛料が知られ

ている。例えば、ヒタミンBなどのヒタミン類、メチオニンなどのアミノ酸類、アセチルコリン誘導体等の血管拡張剤、紫根エキス等の抗炎症剤、エストラジオールなどの女性ホルモン剤、セファランチン等の皮膚機能工進剤などが配合され、脱毛症の予防及び治療に用いられている。

[ 発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来の發毛料はフケ、カユミ、 抜毛等の予防及び改善に有効で、発毛や育毛を促 進するとされているが、いまだ満足すべき効果を 発揮するものは得られていない。

本発明者らはこの課題を解決するために、脱毛防止、発毛、育毛等に有効で、安全性に優れた天然由来の薬剤を鋭意検討した結果、センダン科出物、タイワンセンダン抽出物、センダン抽出物、プラジルのアンジュローバ抽出物及びミカン科のジャボランジ抽出物がこの課題を解決しうることを見出し、本発明を完成するに至った。

[課題を解決するための手段]

即ち、本発明は、センダン科のチャンチン抽出物、タイワンセンダン抽出物、センダン抽出物、 アラジルのアンジュローバ抽出物及びミカン科の ジャポランジ抽出物の一種または二種以上を含有 することを特徴とする変毛料である。

以下、本発明の構成について詳述する。

本発明で用いるセンダン科のチャンチン(Toona sinensis Roemers たはCedrela sinensis Juss 1 EO)は中国各地で栽培される雌雄異株の落聚高木で、根皮を椿根皮(fュンコンピ)、椿白皮(fュンパクヒ)と呼んで、漢方で収斂、止血薬とする植物である。タイワンセンダン(Melia azedarach Linne')はインド、ビルマ、ジャワ、台湾に産し、南欧、アメリカでも栽培し、根皮(Melia Cortex radicis)を健胃、駆虫薬とする植物である。センダン(M, elia azedarach Linne's またはM.japonica Makino)は四国、九州などの本邦温暖地に自生し、一般に本邦では広く栽培する落葉高木で、樹皮を苦株皮(和)(くれんび)と呼び、駆虫薬とする植物である。

また、ミカン科のジャポランジは南米熱帯地方産のミカン科、ピロカルプス(<u>Pilocarpus</u>)属の低木の総称で、特に<u>Pilocarpus Jaborandi、P.microphyllus</u>や<u>P.pennatifolius</u> Lem. などを指す。その干薬は、利尿剤、発汗剤として用いられている。

本発明にはこれら植物の葉、皮、果実、根あるいは茎等を用いるが、葉の抽出物が効果の点で段も優れている。

本発明で用いる植物抽出物の製造方法としてスルシストルの植物を溶媒、例えば、酢酸エエステルがのエステル類、アセトン、メチルエケールン類、アセチルアセチルアセクトン、プロピシングアルルの1~3プチレングリコールを1~3プチレングリコールを1~3プチレングリングの1~5重量%、好ましくは0.01~5重量%、好ましくは0.01~5重量%、

る。 0 . 0 0 5 重量%以下であると、本発明でいう効果が十分に発揮されず、また 1 0 重量%をこえると配合上不利であり、好ましくない。

本発明の養毛料は前記の必須成分に加えて必要 に応じて、本発明の効果を損なわない範囲内で、 化粧品、医薬部外品、医薬品等に一般に用いられ る各種成分、例えば、ポリオキシエチレン(8モ ル)オレイルアルコールエーテル、モノオレイン 酸グリセリル等の油分、ニコチン酸アミド、ニコ チン酸ペンジル、ヒタミンEアセテート、センブ リ抽出物等の血流促進剤、グリチルレチン酸、ヒ ノキチオール等のテストステロンーα-リダクター ゼ阻害剤、エチニルエストラジオール等のホルモ ン類、ヒタミンH、パントテニルエチルエーテル 等の毛根賦活剤、モノラウリン酸ソルビタン、モ ノパルミチン酸ソルヒタン、セスキオレイン酸ソ ルヒタン、トリオレイン酸ソルヒタン、モノラウ リン酸ポリオキシエチレンソルヒタン、モノステ アリン酸ポリオキシエチレンソルピタン、ポリエ チレングリコールモノオレート、ポリオキシエチ

レンアルキルエーテル、ポリグリコールジェステ ル、ラウリルジエタノールアマイド、脂肪酸イソ プロパノールアマイド等の非イオン界面活性剤、 ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、 塩化ベンザルコニウム等のカチオン界面活性剤、 パルミチン酸ナトリウム、ラウリン酸ナトリウム、 ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム、 アルキル硫酸トリエタノールアミン、ロート油、 リニアドアシルベンゼン硫酸、ポリオキシエチレ ン硬化ヒマシ油マレイン酸等のアニオン界面活性 剤、ラウリルジメチルアミンオキサイド、オレイ ルジメチルアミンオキサイド等の半極性界面活性 剂、两性界面活性剂、保湿剂、增粘剂、防腐剂、 酸化防止剤、香料、色剤等を配合することができ る。また本発明の發毛料の剤型は任意であり、例 えばトニック、ヘアークリーム、シャンアー等の 剤型をとることができる。

#### [ 実施例]

次に、この発明の養毛科及びその製造方法と効果を実施例により詳細に説明する。

## 特別平2-83310 (3)

残余

育毛効果の測定(マウスでの育毛効果測定	)	(1)タイワンセンタンアセトン抽出物(乾燥物)	1.0%
雄のC3Hマウス(生後60日)を用し	3、水川	(2)75×19/-ル	残余
らの方法(Normal and Abnormal Epiderm	al Diff	実施例 3	
erentiation, M.Seljl and I.A.Berns	tein 掘	(1)センタンメタノール抽出物(乾燥物)	0.3%
集東大出版会 )に従い実験を行なった。	マウス	(2)75%I9J-A	残 氽
の背部毛を約2×4cmの大きさに剃り、	翌日よ	<b>実施</b> 例 4	
り1日1回ずつ運日サンプル塗布を行なり	1、毛再	(1)アンシュローが抽出物(乾燥物)	0.6%
生が始まった部分の面積比の変化を求め、	毛再生	(2)75%I9J-N	残余
の早さの比較を行なった。サンアルは各権	物抽出	<b>史 施 例</b> 5	
液の乾燥物を75%エタノールに攪拌溶解	₹し、こ	(1) ヴャポラング(Pilocarpus jaborandi) 75%15	
れに界面活性剤を添加、溶解しサンプルと	し、実	ノール抽出物(乾燥物)	2.0%
施例1~9とした。比較例としては75%コ	エタノー	(2)75XI9J-A	残余
ルを用いた。		实施例 6	
•		(1) ジャポラング(Pilocarpus microphyllus) 酢	
比較例 1		酸 フチル抽出物(乾燥物)	3.0%
( 1)75%I9J-&	残 余	(2)75%I9J-1	残余
実 施 例 1	•	<b>夷施例</b> 7	
(1)チャンチン酢 酸エチル抽 出 物(乾燥物)	0.5%	(1) ヴャポランジ <u>(Pilocarpus</u> pennatifolius	
(2)75%I9J-h	残 余	Lem.)50%15/-ル抽出物(乾燥物)	5.0%
·· ·			

爽	施 例 8	
	(1)tンタンエタノール抽出物(乾燥物)	0.5%
	(2)ジャズランラ( <u>Pilocarpus</u> jaborandi)熱水	
	抽出物(乾燥物)	3.0%
	(3) ヴャポラング( <u>Pilocarpus microphyllus</u> )7	
	セトン抽 出 物(乾 燥 物)	1.5%
	(4)75%19J-R	残余
奖	施 例 9	
	(1)チャンチン水抽出物(乾燥物)	0.5%
	(2)タイワンセンタンアセチルアセトン抽出物(乾燥物)	1.0%
	(3)センタン80%メタタノール抽出物(乾燥物)	0.3%
	(4) シャホランシ( <u>Pilocarpus</u> <u>jaborandi</u> )25%19	
	ノール抽 出 物(乾 燥 物)	2.0%
	(5)ジャズラング( <u>Pilocarpus</u> <u>microphyllus</u> )酢	
	酸フチル抽 出 物(乾燥物)	0.1%
	(6) ジャボラング <u>(Pilocarpus pennatifolius</u>	
	Lem.)50%19ノール抽 出 物(乾 燥 物)	4.5%
	(7)75%I9J-&	残 余
	各試料ともマウス10匹すつを用い、毛細	生 速
度	の変化率の平均値を求めた。20日後毛細	生面

実施例 2

## 後の結果を百分率にて表-1に示した。

(2)75%I9J-A

## 表 1 各試料の毛再生面積(20日後)

試料		毛再生面積
比較例	1	• 5%.
夹 施 例	1	55%
<b>夷施</b> 例	2	65%
実 施 例	3	48%
<b>爽施例</b>	4	50%
実 施 例	5	80%
<b>実施例</b>	6	86%
実 施 例	7	97%
実 施 例	8	87%
<b>実施</b> 例	9	95%

表 - 1 から明らかなように各実施例において毛 の再生に対する効果が認められた。

## 実施例 10 ヘアートニック

0.1%
0.1%
0.3%

(4)グャ系ラング(<u>Pilocarpus</u> <u>jaborandi</u>)95%Iタ

ノール抽 出 物(乾燥物)	0.2%
(5) ウャホランク(Pilocarpus microphyllus)酢	
酸 エチル抽 出 物 (乾 燥 物)	0.1%
(8) ジャポラング(Pilocarpus pennatifolius	
Lem.)58XI9J-ル抽 出 物(乾 燥 物)	0.2%
(7) ブロビレングリコール	5.0%
(8)ヒアルロン酸ナトリウム 0	.01%
(9)75XI9J-A	残 氽
上記処方にて製造したヘアートニックにつ	いて
実	
使用にてフケ、発毛、脱毛等の症状に対する	効 果
を検討した。	
フケ、発毛、脱毛等の症状を呈する15名	の男
性 (年齢 2 5 才~ 6 2 才 ) に 1 日 1 ~ 2 回 、	
5m1ずつ4カ月にわたって投与し、表一2	

果を得た。 表 - 2 から明らかなように、このヘアートニックはフケ、発毛及び脱毛に優れていた。

2% 表一2 使用試験結果

被験者	年齢	フケ	発毛	脱毛
I	3 7	有効	有効	無効
11	4 8	有効	著効	有効
111	4 5	有効	有効	有効
J۷	3 5	無効	有効.	有効
V	3 7	著 効	著 効	有効
VI	4 6	有効	有効	有効
VII	4 3	有効	有効	無効
VŒ	5 8	有効	有効	有効
ıx	3 4	有効	有効	有効
x ·	3 8	有効	有効	有効
ХI	59	有効	有効	無 効
хп	5 3 ·	著 効	無効	有効
X III	5 2	有効	有効	無効
X IV	4 4	有効	有効	有効
χV	6 0	有効	有効	有効

実施例 11 ヘアートニック 次の処方に従い常法によりヘアートニックを得

<i>t</i> .		次の処方に従い常法によりシャンアーに	を得た。
(1)チャンチン1,3ーフチレンクリコール抽出物(乾燥物)	0.1%	(1) 精製水	79.5%
(2) ヴャポラング(Pilocarpus pennatifolius		(2)ラウリル硫酸トリエタノールアミン	15.0%
Lem.)アセトン抽 出 物(乾 燥 物)	0.2%	(3)ヤシ油 脂 肪 酸モノエタノールアマイド	5.0%
(3) プロピレングリコール	5.0%	(4)グャポラング( <u>Pilocarpus microphyllus</u> )	
(4)ヒアルロン 酸 ナトリウム	0.01%	クタノール抽出物(乾燥物)	0.5%
(5)75%19/-1	残余	(5)香料	適 量
(6)香料	適益	(6)色素	透量
(7) 色素	適量	実施例 1.4 頭皮用乳液	
実施例 12 ヘアートニック		次の処方に従い常法により頭皮用乳液	を得た。
次の処方に従い常法によりヘアートニック	フを得	(1) ポリオキシエチレングリコール 1500	2.0%
t.		(2)トリエタノールアミン	0.7%
(1)チャンチン水 抽 出 物(乾 燥 物)	0.1%	(3)精製水	78.0%
(2)アンシュローメ1,3ーフチレンクリコール抽出物(乾燥物)	0.3%	(4)ステアリン 酸	1.2%
(3) プロピレングリコール	5.0%	(5) tf k 7 k 3 - k	0.7%
(4)ヒアルロン酸 ナトリウム	0.01%	(6) ワセリン	2.5%
(5)75%19/-ル	残余	(7) スクワラン	5.0%
(6) 香料	適 盘	(8)ポリオキシエチレン(10モル)モノオレイン 酸 エステル	1.0%
(7) 色 素	適 量	(9) プロゼレングリコール	2.5%
実施例 13 シャンアー		(10)チャンチンアセトン抽出物(乾燥物)	3.1%

## 特開平2-83310 (5)

(11)949	ンセンダンアセチルアセ	トン抽出物(乾燥	桑 (物 )	1.53
(12)香料	4			適量
(13)色素	ŧ			透量
実 施 例	15 174	<b>5</b> 料		
次の処	方に従い常る	まにより 育毛オ	4を得た。	
(1)19/	- n		6	57.5%
(2)精多	<b>ł</b> 水		:	22.5%
(3)ビタミ	ンEアセテート			0.23
(4)=3f	ン酸アミド		(	0.05%
(5)214	f t - ル		(	0.05%
·(6) ウリチ	ルレチン酸			0.1%
(7)センブ	リ抽出物(乾燥	<b>录物)</b>	(	0.023
(8)17=	ルエストラジオール			4 p p m
(9)ビタミ:	νH		(	0.03%
(10) X>F	テニルエチルエーテル			0.2%
(11) センダ	ンメタノール抽 出 牧	か(乾燥物)	(	.03%

実施例 11~15の処方の養毛料は、安定性 もよく発毛効果に優れたものであった。

#### [発明の効果]

本発明に係る養毛科は、上記のように構成されているものであるから、フケ、発毛、脱毛等の症状に対し優れた効果をもつものである。

出願人 株式会社 資生堂